

**IDENTIFICACIÓN Y PLANTEO DE PROBLEMAS DE SALUD
Ciudad de Rosario. 2013**

1. RIESGOS:

Porcentaje de nacidos vivos de madres menores de 20 años residentes en la ciudad de Rosario. Período 2010-2014

Nacidos madres menor 20 años	2010	2011	2012	2013	2014
Rosario	14,8% *	14,4%**	14,2%**	12,7%**	12,8 %***

FUENTE: (*)Dirección General de Estadística. Municipalidad de Rosario. Anuario Estadístico de la Ciudad de Rosario. Edición 2001

(**)Dirección General de Estadística. Municipalidad de Rosario elaboración propia en base a los informes estadísticos provistos por Registro Civil y Ministerio de Salud, provincia de Santa Fe

(***)Anuario de Población y Estadísticas vitales 2014 en:

<http://www.rosario.gov.ar/ArchivosWeb/Anuario%20de%20Poblaci%C3%B3n%20y%20Estad%C3%ADsticas%20Vitales%202014>

Porcentaje de nacidos vivos de madres menores de 20 años según jurisdicción de residencia de la madre. Período 2010-2012

Nacidos madres menor 20 años	2010	2011	2012
Provincia Santa Fe	17,7% (1)	17,4% (2)	16,8% (3)
Argentina	15,8% (4)	15,9% (5)	

FUENTES:(!)Dirección de Estadísticas e Información en Salud. Sistema Estadístico de Salud. Ministerio de Salud de la Nación Argentina. Estadísticas Vitales.

Información Básica Año 2010. Serie 5-Número 54. Bs.As, Diciembre 2011.

(2)Dirección de Estadísticas e Información en Salud. Sistema Estadístico de Salud. Ministerio de Salud de la Nación Argentina. Estadísticas Vitales. Información Básica Año 20101 Serie 5-Número 55. Bs.As, Diciembre 2012.

(3)Dirección de Estadísticas e Información en Salud. Sistema Estadístico de Salud. Ministerio de Salud de la Nación Argentina. Estadísticas Vitales. Información Básica Año 20102 Serie 5-Número 56. Bs.As, Diciembre 2013

(4)Ministerio de Salud de la Nación Argentina y Organización Panamericana de la Salud. Indicadores Básicos Argentina 2012

(5)Ministerio de Salud de la Nación Argentina y Organización Panamericana de la Salud. Indicadores Básicos Argentina 2013.

Embarazo adolescente

Tendencia local decreciente de embarazo adolescente.

Tendencia provincial decreciente de embarazo adolescente en el período 2010-2012.

Comparando el mismo período, la Provincia tiene porcentajes más altos que la Nación.

Porcentaje de Recién Nacidos de bajo peso al nacer
(menor a 2.500 gr) de madres residentes en Rosario,
en la Provincia de Santa Fe y en Argentina.
Período 2010-2013

Porcentaje de RN de bajo peso al nacer	2010	2011	2012	2013	2014
Ciudad de Rosario*	8,09	8,47	8,29	7,19	4,46
Provincia de Sta Fe	7,2 ⁽¹⁾	7,6 ⁽²⁾	7,6 ⁽³⁾	-	
Argentina	7,2 ⁽⁴⁾	7,2 ⁽⁵⁾	-	-	

Fuentes: *Dirección General de Estadística. Municipalidad de Rosario
(1) Dirección de Estadísticas e Información en Salud. Sistema Estadístico de Salud. Ministerio de Salud de la Nación Argentina. Estadísticas Vitales. Información Básica Año 2010. Serie 5-Número 54. Bs.As, Diciembre 2011.
(2) Dirección de Estadísticas e Información en Salud. Sistema Estadístico de Salud. Ministerio de Salud de la Nación Argentina. Estadísticas Vitales. Información Básica Año 2011. Serie 5-Número 55. Bs.As, Diciembre 2012.
(3) Dirección de Estadísticas e Información en Salud. Sistema Estadístico de Salud. Ministerio de Salud de la Nación Argentina. Estadísticas Vitales. Información Básica Año 2012. Serie 5-Número 56. Bs.As, Diciembre 2013.
(4) Ministerio de Salud de la Nación Argentina y Organización Panamericana de la Salud. Indicadores Básicos Argentina 2012.
(5) Ministerio de Salud de la Nación Argentina y Organización Panamericana de la Salud. Indicadores Básicos Argentina 2013.

Recién Nacidos
de Bajo Peso

Tendencia local estable del porcentaje de NV de bajo peso al nacer, superior a la proporción Provincial y Nacional.

Coberturas de inmunizaciones

Cambio de sistema de registro hacia un sistema único de registro nominalizado: SICAP

Cobertura de vacunas inferior a 95 % en el grupo de edad AÑO 2013

- RN: Hepatitis B (antes de las 12 hs): 88%
- > 1 año: 3ª Sabín : 61,3%
3º Pentavalente: 63,7 %
- 1 año: Triple viral : 65,2 %
HA: 63,3%
- 18 meses: Rzo cuádruple: 56,9 %
Sabín: 53,8 %
- 6 año: Rzo sabín: 53,3 %
Triple Viral: 43,6 %
DPT: 53,5 %

Fuente: Programa Provincial de Inmunizaciones. Ministerio de Salud de la Provincia de Santa Fe

Nota: Hace 3 años se decide incorporar un sistema único informático en la Provincia de Santa Fe: el SICAP
Consiste en cargar la dosis de vacunas aplicada en forma nominalizada, lo cual mejora ampliamente la calidad del dato pasando del indicador “dosis aplicada” con una cruz, a un sistema informático único de cada niño con su “Nombre , Apellido y su esquema de vacunación”

Los datos de cobertura pertenecen al Departamento Rosario.

Coberturas inferiores al 95% en esquema oficial de inmunizaciones.

- En vigencia la implementación del Sistema de Información de Centros de Atención Primaria SICAP, registro único informático nominalizado en la Provincia de Santa Fe.

- Datos que corresponden al Departamento. Faltan datos locales desagregados

Alta prevalencia de Factores de Riesgo de Enfermedades No transmisibles
FRENT

Proporción de sobrepeso según jurisdicción. Período 2005-2009

SOBREPESO	Nacional %	Provincial %
2005	34,4	52,1
2009	35,4	45,8

FUENTE: Encuesta Nacional de Factores de Riesgo 2005 y 2009

-Mayor proporción de sobre peso en la Provincia durante el 2009 (45,8%) en comparación con el nivel Nacional del mismo año (35,40%).

-Tendencia provincial decreciente. Años 2005-2009

Proporción de Obesidad según jurisdicción. Período 2005-2009

Obesidad (IM>30)	Nacional %	Provincial %
2005	14,6	16,8
2009	18	20

FUENTE: Encuesta Nacional de Factores de Riesgo 2005 y 2009

-Prevalencia de obesidad (IMV>30) en la Provincia superior a la Nacional en 2009.

-Tendencia provincial decreciente. Años 2005-2009

Proporción de Consumo regular de riesgo de alcohol según jurisdicción. Período 2005-2009

Consumo regular de riesgo de alcohol	Nacional %	Provincial%
2005	9,6	14,7
2009	10,7	13,7

FUENTE: Encuesta Nacional de Factores de Riesgo 2005 y 2009

-Proporción de adultos con consumo regular de riesgo de alcohol en la Provincia Superior a la Nacional. Año 2009

Tendencia provincial descendiente. Período 2005-2009.

Proporción de Actividad física baja, según jurisdicción. Período 2005-2009

Actividad física baja	Nación %	Provincia %
2009	54,9	58,4

FUENTE: Encuesta Nacional de Factores de Riesgo 2009

-Población adulta con baja actividad física en la Provincia Superior a la Nacional.

Proporción de personas que comen diariamente verdura, según jurisdicción. Período 2005-2009

% que come diariamente verdura	Nación %	Provincia %
2009	37,6	33,1

FUENTE: Encuesta Nacional de Factores de Riesgo 2009

- Proporción de adultos que consume diariamente verduras en la provincia inferior a la Nacional en 2009.

Proporción de Consumo de alcohol en estudiantes en Pcia de Santa Fe. Período 2007-2011

% Consumo de alcohol en estudiantes	Masc	Fem
2007	80,1	73,3
2009	77,8	74
2011	83,5	77

Fuente: Encuesta Nacional de Estudiantes de Enseñanza Media años disponibles. 2011

- Tendencia creciente en la Provincia del consumo de alcohol en estudiantes de enseñanza media de ambos sexos. Período 2007-2011.

Prevalencia de Consumo Provincial de sustancias psicoactivas en estudiantes de Enseñanza Media. Período 2007-2011

HOMBRE	2007	2009	2011
Tranquilizante sin pm	4	3,3	6,4
Marihuana	13,4	14,4	16,4
Pasta base-Paco	2,5	1,8	3,2

Fuente: Encuesta Nacional de Estudiantes de Enseñanza Media años disponibles. 2011

- Tendencia creciente en la Provincia del consumo de tranquilizantes sin pm, marihuana y pasta base en estudiantes varones de enseñanza media.

Proporción de Factores
Protectores de FRENT

Proporción de personas que comen diariamente fruta, según jurisdicción. Período 2005-2009.

% que come diariamente fruta	NACIÓN	PROVINCIA
2005	64,7	38
2009	35,7	38,2

FENTE: Encuesta Nacional de Factores de Riesgo 2005-2009

**-Proporción de adultos con consumo de frutas en la Provincia superior a la Nacional
Tendencia provincial estable, período 2005 y 2009**

Proporción de adultos que siempre agrega sal, según jurisdicción. Año 2009

Proporción de adultos que siempre agrega sal	Nación %	Provincia %
2009	25,3	23,8

FUENTE: Encuesta Nacional de Factores de Riesgo 2009

-Proporción de adultos que agrega sal a las comidas Provincial inferior a la Nacional en 2009.

Proporción de Hipertensión arterial, según jurisdicción. Año 2009

% HTA	Nación %	Provincia %
2009	34,8	33,5

FUENTE: Encuesta Nacional de Factores de Riesgo 2009

- Prevalencia de Hipertensión arterial en la Provincia inferior a la Nacional.

Proporción de Colesterol elevado, según jurisdicción. Año 2009

Colesterol elevado (los que se midieron)	Nación %	Provincia %
2009	29,1	25,4

FUENTE: Encuesta Nacional de Factores de Riesgo 2009

-Prevalencia de Hipertensión en la Provincia inferior a la Nacional en 2009.

Proporción de Diabetes, según jurisdicción. Año 2009

Diabetes (Población total)	Nacional %	Provincial %
2009	9,6	8,7

FUENTE: Encuesta Nacional de Factores de Riesgo 2009

-Prevalencia de Diabetes en la Provincia inferior a la Nacional en 2009.

Proporción de Consumo de tabaco y Exposición al humo de tabaco ajeno, según jurisdicción. Año 2009

	Nación %	Provincia %
2009		
Consumo de tabaco	27,1	26,65
Exposición al humo de tabaco ajeno	40,4	37,4

FUENTE: Encuesta Nacional de Factores de Riesgo 2009

-Proporción de adultos con consumo de tabaco y expuestos al humo de tabaco ajeno en la Provincia inferior a la Nacional. Año 2009

Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas en la Provincia de Santa Fe según sexo. Período 2007-2011

Consumo de Tabaco	Masculino	Femenino
2007	41,7	42,1
2009	42,3	40,8
2011	40,4	36,8

Fuente: Encuesta Nacional de Estudiantes de Enseñanza Media años disponibles . 2011

-Tendencia decreciente de consumo de tabaco en la Provincia en estudiantes de enseñanza

2. ENFERMEDADES

Proporción de egresos según capítulos del CIE 10.
Efectores Municipales 2010-2012

Proporción de egresos	2010	2011	2012
Enf del sist Digestivo	16,2	11,6	11,3
Enf del Sist. Respiratorio	15,6	15,2	15,5
Traumatismos y otras causas externas	11	15,7	17,1

FUENTE: Direcció de Estadística. Secretaria de Salud Pública. Rosario 2014

La principal causa de Egreso Hospitalario en efectores Municipales son:

- **Traumatismos y otras causas externas**
- **Enf del Sist. Respiratorio**
- **Enf del Sist. Digestivo**

Tendencia creciente en la proporción de egresos por traumatismos y otras causas externas. Período 2010-2012

Por ser alta proporción de causa de Egreso Hospitalario o Proporción creciente de egresos.

Proporción de egresos según capítulos del CIE 10, por edad y Sexo. Efectores Municipales 2012

Grupo de edades	VARON		MUJER	
	% egreso	Diagnóstico Principal	% egreso	Diagnóstico Principal
< 15 años	25,5	Enf. Del sist. respiratorio	24,3	Enf. Del sist. respiratorio
15 a 19	45,8	Trauma y causas externas	17,8	Trauma y causas externas
20 a 39	35,6	Trauma y causas externas	19,9	Enf. Sistema digestivo
40 a 65	14,6	Enf del sist. digestivo	13,3	Enf. Del sistema digestivo
+ de 66	21,6	Enf. Del sist. circulatorio	18,4	Enf. Del sistema circulatorio

FUENTE: Direcció de Estadística. Secretaria de Salud Pública. Rosario 2012

Durante el 2012 en los efectores Municipales, la mayor causa de egresos hospitalarios por edad fueron:

- **Enfermedades del sistema respiratorio, primer diagnóstico de egreso hospitalario en menores de 15 años en ambos sexos**
- **Trauma y causas externas, primer diagnóstico de egreso hospitalario en ambos sexos entre 15 y 19 y en varones de 20 a 39.**
- **Enfermedades del sistema circulatorio, primer diagnóstico de egreso hospitalario en adultos mayores de 66 años.**

MORBILIDAD

Principales motivos de consultas en APS (% de frecuencias).

Efectores Municipales

Consultas en %	2009	2010
Rinitis, adenoiditis, rinofaringitis	10	14
Enf. Piel y tejido s/c	4,7	6,8
Enf. del sist. Osteoarticular	3,9	5,6
Bor	3,8	5
Enf. Hipertensiva	3	4,3
Asma	2,2	3,2
Diabetes	2,1	3,1

FUENTE: Dirección de Estadística SSP. Municipalidad de Rosario 2012

-Aumento en la proporción de Consultas ambulatorias en los Centros de APS por rinitis, adenoiditis, rinofaringitis, enf de la piel y tejido s/c, enf del sist osteoarticular, bor, HTA, asma.

-Los problemas respiratorios son la principal causa de consulta en los Centros de Atención Primaria de los efectores municipales, periodo 2009-2010

Por ser alta proporción de causas de consultas ambulatorias

Enfermedades de Notificación Obligatoria (C2), según patologías. Hospitales Municipales de Rosario.

Período 2010-2013

CLASIFIC. AGRUPADA	2010	2011	2012	2013
Inf de transmisión sexual	1123	1739	930	1039
Inf respiratorias agudas	4187	4266	5576	5020
Intoxicaciones	521	832	761	534
Accidentes viales	387	309	218	155

Fuente: Sistema Municipal de Epidemiología. Secretaría de Salud Pública. Municipalidad de Rosario, Octubre 2014

Nota: a partir de datos disponibles en el Sistema de Gestión Médico Administrativo (Datatech)

- Tendencia creciente de notificaciones de ETS (C2) entre 2012-2013

- Tendencia creciente de notificaciones de infecciones respiratorias agudas entre 2010-2013.

-Tendencia decreciente de notificaciones por intoxicaciones entre 2012-2013

- Tendencia decreciente de notificaciones por accidentes viales entre 2012-2013

Enfermedades de Notificación Obligatoria SNVS *

Frecuencia anual de Enfermedades de Notificación Obligatoria (C2), según patológica y grupo etáreo. Hospitales Municipales de Rosario. Año 2013

CLASIFICACIÓN AGRUPADA	GRUPO ETAREO	FRECUENCIA DE NOTIFICACION
Inf. respiratoria agudas	0 a 9	3087
Afecciones gastroentéricas	10 a 19	678
Accidentes en el hogar	20 a 39	1190
Inf de transmisión sexual	40 a 49	306
Inf respiratorias agudas	50 y más	664

Fuente: Sistema Municipal de Epidemiología. Secretaría de Salud Pública. Municipalidad de Rosario, Octubre 2014

Nota: a partir de datos disponibles en el Sistema de Gestión Médico Administrativo (Datatech)

- **Infecciones respiratorias, notificación más frecuente en el grupo etáreo de 0 a 9 años**
- **Afecciones gastroentéricas, notificación más frecuente en el grupo etáreo de 10 a 19 años.**
- **Accidentes del hogar, notificación más frecuente entre 20 y 39 años.**
- **Infecciones de transición sexual, notificación más frecuente ene el grupo etáreo de 40 a 49 amos.**
- **Infecciones respiratorias, notificación más frecuente en adultos de 50 años y más.**

Brotos en la ciudad de Rosario:

Año 2008: Brote de Rubeola

año 2009: Brote de Influenza (H1N1)

Dengue Tipo 1

año 2010: Dengue Tipo 4

Año 2011: Leptospirosis

Fuente: Sistema Municipal de Epidemiología. Secretaría de Salud Pública . Municipalidad de Rosario. Rosario diciembre 2014

- **Ausencia de brotes 2012-2013**

3. DISCAPACIDAD

Proporción de Personas con Discapacidad según tipo:

- Motora 31%
- Visual 14,4%
- Auditiva 12,2%
- Mental 12,1%
- Del habla 2,1%
- Dos o más discapacidades 26,1%

La mayor proporción de discapacidad en la ciudad de Rosario durante el 2012 es la motora (31%).

FUENTE: Dirección Municipal para la inclusión de personas con Discapacidad. Rosario 2012

MORTALIDAD

Materna

Evolución Tasa de Mortalidad Materna en Rosario 2010-2013

AÑOS	NACIDOS VIVOS	MUERTES MATERNAS	TMM / 10.000 NAC. VIVOS
2010	15.447	0	-
2011	16.200	2	1,23
2012	15.961	7	4,38
2013	16.886	5	2,9

FUENTE: Dirección General de Estadísticas. Municipalidad de Rosario. 2014

Tasa de Mortalidad Materna según jurisdicción. Año 2011-2012

Año	TMM Rosario**	TMM Provincial*	TMM Nacional*
2011	1,23	2,2	4
2012	4,38	3	3,5

FUENTE: (*)Natalidad, Mortalidad Gral, infantil y materna por lugar de residencia. Argentina 2010 DEIS. Boletín N° 134. MSAL

(**)Dirección General de Estadísticas. Municipalidad de Rosario. 2014

-Tasa decreciente de Mortalidad Materna local 2012-2013 e inferior a la nacional para 2011.

- En el 2012 la TMM local es superior a la provincial y Nacional.

Infantil

Evolución de la Tasa de Mortalidad Infantil.
Rosario y Nación 2008-2014

AÑO	Defunciones* menores 1 año	Nacidos Vivos*	TMI Rosario * c/ 1.000 NV	TMI Nación ** c/ 1.000 NV
2008	170	16187	10,5	12,5
2009	154	15667	9,8	12,1
2010	163	15447	10,6	11,9
2011	194	16200	12	11,7
2012	151	15961	9,46	11,1
2013 ⁽¹⁾	152	16887	9	-
2014 ⁽¹⁾	184	17398	10,58	-

Fuente:(*) Dirección General de Estadística. Municipalidad de Rosario 2014.
(1)Anuario de Población y Estadísticas vitales 2013 y 2014 Recuperado de:
<http://www.rosario.gov.ar/ArchivosWeb/Anuario%20de%20Poblaci%C3%B3n%20y%20Estad%C3%ADsticas%20Vitales%202014>

(**) Indicadores Básicos 2013. MSAL-OPS Argentina 2013

- **Tasa local decreciente de Mortalidad Infantil.**
- **En el 2012 inferior al dígito y menor a la Nacional.(Último año publicado)**

Tasas de Mortalidad Infantil según Distritos. 2014

DISTRITOS	TMI (x1000)
Centro	6,30
Norte	9,79
Noroeste	12,24
Oeste	15,21
Sudoeste	12,48
Sur	7,61
ROSARIO	10,58

FUENTE: Anuario de Población y Estadísticas vitales 2014. Dirección General de Estadística. Municipalidad de Rosario .Recuperado de:

<http://www.rosario.gov.ar/ArchivosWeb/Anuario%20de%20Poblaci%C3%B3n%20y%20Estad%C3%ADsticas%20Vitales%202014>

- **Tasa de Mortalidad Infantil superior al promedio de la ciudad en el Distrito Oeste y Noroeste y Sudoeste**

Evolución de la Tasa de Mortalidad Precoz, Tardía y Post Neonatal.
Rosario 2008-2014

TASA DE MORTALIDAD c/1.000 Nacidos Vivos	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
NEONATAL PRECOZ	5,93	4,34	5,44	4,29	5,45	4,32	5,52
NEONATAL TARDÍA	1,30	1,72	1,94	2,63	2,44	2,19	2,47
POST NEONATAL	3,58	3,38	3,24	4,61	1,57	2,49	2,59

Fuente: Dirección General de Estadística. Municipalidad de Rosario 2014

- **Tendencia local decreciente de la Tasa de Mortalidad Precoz y Post Neonatal**
- **Tendencia local creciente de la Tasa de Mortalidad Tardía.**

Evolución de la Tasa de Mortalidad en menores de 1 a 5 años.
Rosario 2007-2012

Menores de 5 años

AÑOS	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Tasa de mortalidad en menores 5 años c/ 10mil habitantes	5,66	3,91	4,69	4,1	3,9	2,25

FUENTE: Dirección General Estadísticas. Municipalidad de Rosario. 2013

Comparación del año 2010 con Nivel Provincial: 4,42
Regional: 3,99

Nacional: s/d

-La tasa de mortalidad en menores de 5 años presenta una tendencia local decreciente en el periodo 2007-2012. (5,66 - 2,25 c/ 10mil hab) Durante el año 2010 este indicador presenta valores similares en comparación con la Provincia.

Adolescentes:

Evolución de la Tasa de mortalidad en adolescentes.
Rosario 2007-2012

AÑOS	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Tasa en mortalidad adolescente. c/ 10 mil habitantes	2,68	1,68	2,48	2,42	2,15	1,96

FUENTE: Dirección General de Estadística. Municipalidad de Rosario

2010:
Regional: 11,30 /10.000/h
Provincia: 8,34 /10.000/h

Tasa de mortalidad en adolescentes: Tendencia local descendiente (2007-2012) y valores inferiores a los regionales y provinciales durante el 2010

General

Proporción de las principales causas de mortalidad general .
Rosario 2008-2013

CAUSAS %	2008	2009	2010	2013
Tumores	21,5	22,4	21,4	20,4
Enf. Cardíacas	17,3	21,9	16,9	21,2
Enf. Respiratorias	11,9	7,2	12,3	14,9
Enf. Cerebrovasculares	6,9	6,7	5,9	
Mal Definidas	10,6	10,5	11,1	12,6
Diabetes	3,9	3,4	3,5	

FUENTE: Dirección General de Estadísticas. Municipalidad de Rosario. Edición Bicentenario, 2010 y 2011.

Durante el periodo 2008-2013 las 3 principales causas de mortalidad en la ciudad de Rosario son los tumores, las enfermedades cardíacas y respiratorias.

Defunciones según principales causas por grupos seleccionados de edad.
Rosario 2013.

CAUSAS	14 A 24 AÑOS	25 A 29 AÑOS	40 A 50 AÑOS
Causas externas de morbi-mortalidad	143 (76,8%)	148 (4908%)	64
Síntomas y hallazgos laboratorio no clasificado	11	23	98
Tumores (neoplasias)	8	48	198 (32,9%)
Enf. infecciosas y parasitarias	4	25	35

Enf. Del sist. circulatorio	3	11	71
Otras	17	42	135
Total para la edad	186	297	601

FUENTE: Dirección General de Estadísticas. Municipalidad de Rosario. 2014

- **Causas externas principal causa de muerte entre 14 y 39 años**
- **Tumores principal causa de muerte entre 40 y 50 años.**

Proporción muertos en accidentes de tránsito por edades según consecuencia, registrados en la vía pública del departamento Rosario
Período 2008-2010

Proporción de muertos en accidentes de tránsito s/edades	2008	2009	2010
15-24	24,74	17,5	6,19
25-29	19,2	13,1	10,1
30-34	26,1	7,6	9,8

FUENTE: Dirección General de Estadística. 2011 Rosario

Se registra una importante tendencia decreciente de muertes por accidentes de tránsito en el Departamento Rosario durante el período 2008-2010

Evolución de la tasa de mortalidad por colisiones de tránsito.
Rosario 2006-2012

Año	Víctimas Fatales	Población de Rosario	Tasa cada 100.000 hab.
2006	102	909.658	11,2
2007	73	909.710	8,0
2008	58	909.762	6,4
2009	71	909.814	7,8
2010	33	948.312	3,5
2011	72	948.366*	7,5
2012	62	948.420*	6,5

Fuente: Certificados de Defunción. Dirección General de Estadística. Municipalidad de Rosario. *Estimaciones a partir del Censo Nacional de Población 2010

- **La tasa de mortalidad por colisión de tránsito para el año 2012 muestra una leve disminución en comparación con el año 2011.**
- **Tendencia local Decreciente de víctimas mortales por accidentes de tránsito. Rosario 2006-2012.**

Necesidades del contexto y SSS.

- Promover el desarrollo equilibrado de los diferentes Distritos en el marco del crecimiento de la ciudad
- Ordenamiento urbano del territorio municipal teniendo en cuenta los espacios públicos, el suelo, la red vial, los equipamientos colectivos, infraestructura y servicios básicos
- Atender las problemáticas de vivienda, movilidad patrimonios históricos y arquitectónicos, las industrias y los servicios básicos

- Extender las redes de agua potable y desagües cloacales y pluviales a sectores carentes de ellos

Información

Información parcial de:

- Adicciones
- Causas de discapacidad
- Inmunizaciones datos que corresponden al Departamento, no se encuentra desagregada la ciudad.

Estado de Salud:

Información local que no revela problemas de Salud

- Tendencia local decreciente de embarazo adolescente.
- Tasa de mortalidad infantil inferior al dígito y menor a la provincial y nacional . Año 2012
- Tendencia decreciente de notificaciones por intoxicaciones entre 2012-2013
- Tendencia decreciente de notificaciones por accidentes viales entre 2012-2013
- Ausencia de brotes 2012-2013
- Tendencia decreciente de mortalidad materna 2012-2013 inferior a la nacional para 2011 ultimo publicado.
- Tendencia local decreciente de víctimas mortales por accidentes de tránsito

Información local que revela problemas de Salud

- Tendencia estable del porcentaje de NV de bajo peso al nacer, superior a la proporción provincial.
- Tasa de mortalidad infantil superior al promedio de la ciudad en el Distrito Oeste y Norte.
- Coberturas inferiores al 95% en esquemas oficial de inmunizaciones.
- Enfermedades del sistema respiratorio, primer diagnóstico de egreso hospitalario en menores de 15 años en ambos sexos.
- Trauma y causas externas, primer diagnóstico de egreso hospitalario en ambos sexos entre 15 y 19, años y varones de 20 a 39 años.
- Enfermedades del sistema circulatorio, primer diagnóstico de egreso hospitalario en adultos mayores de 66 años.
- Tendencia creciente de notificaciones de ETS (C2) entre 2012-2013.
- Infecciones respiratorias notificación más frecuente (C2) en el grupo etáreo de 0 a 9 años.
- Afecciones gastroentéricas, notificación más frecuente (C2) en el grupo etáreo de 10 a 19 años.
- Accidentes del hogar, notificación más frecuente (C2) entre 20 y 39 años.
- Infecciones de transmisión sexual, notificación más frecuente (C2) en el grupo etáreo de 40 a 49 años.
- Infecciones respiratorias, notificación más frecuente (C2) en adultos de 50 años y más.
- Causas externas principal causa de muerte entre 14 y 39 años.
- Tumores principal causa de muerte entre 40 y 50 años.
- Discapacidad motora primer tipo de discapacidad local.

Información Provincial que revela problemas de salud.

- Prevalencia de obesidad (IMV>30) en la provincia superior a la nacional.
- Proporción de adultos que consume diariamente verduras en la provincia inferior a la nacional.
- Población adulta con baja actividad física en la provincia superior a la nacional.

- Proporción de adultos con consumo regular y episódico excesivo de alcohol en la provincia superior a la nacional.
- Tendencia creciente en la provincia del consumo de alcohol en estudiantes de enseñanza media de ambos sexos.
- Tendencia creciente en la provincia del consumo de tranquilizantes sin PM, marihuana y pasta base en estudiantes varones de enseñanza media.

Información Provincial que no revela problemas de salud

- Proporción de adultos con consumo de tabaco y expuestos al humo ajeno en la provincia inferior a la nacional.
- Proporción de adultos con consumo de frutas en la provincia superior a la nacional.
- Proporción de adultos que agrega sal a las comidas inferior a la nacional.
- Menor prevalencia de sobrepeso en la provincia comparado con nación.
- Prevalencia de hipertensión en la provincia inferior a la nacional.
- Prevalencia de hipercolesterolemia en la provincia inferior a la nacional.
- Prevalencia de diabetes en la provincia inferior a la nacional.
- Tendencia decreciente de consumo de tabaco en la provincia en estudiantes de enseñanza media.